



TRILANO LN

HERBICIDA

Herbicida sistémico
post-emergente selectivo
para el control de plantas
leñosas así como malezas
anuales y perennes.

TRILANO LN



Con equipos terrestres, usando boquillas de abanico plano y en especial antideriva, calibrar la máquina con una presión 20/50lb y un gasto de agua entre 50-400 L logrando una homogeneidad de gotas medias a finas, y en aplicaciones aéreas calibrar para utilizar entre 20-50 L de agua / ha.



Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	% en peso	Contenido / vol
TRICLOPIR BUTOXIETIL ESTER	61,7 %	667 g/L
EQUIVALENTE TRICLOPIR	44,4 %	480 g/L

Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico		
Arroz (Oryza sativa L)	Chirca	Eupatorium buniifolium	1,0 a 1,25 L/ha	Aplicación en post-emergencia temprana. Aplíquese cuando el cultivo de arroz se encuentre entre 3 y 4 hojas (15 días después de la emergencia) y la maleza entre 2 y 4 hojas.
	Chirca blanca	Baccharis spicata		
Campo natural	Espinillo	Acacia caven	1,0 a 2,0 Lt/100 Lt	Control basal en gasoil de leñosas y semileñosas. Aplicar a la base del tronco hasta 0,4 a 1,0 metro de altura.
	Eucaliptos	Eucaliptus spp.	1,5 a 2,0 Lt/100 Lt *	Tocones en gasoil: Leñosas y semileñosas. Aplicar en la superficie del corte, en la corteza subyacente y raíces expuestas enseguida de la tala.
	Zarzamora	Rubus fruticosus	0,5 a 0,75 Lt/100 Lt	Pulverizar el tallo hasta 30 - 40 cm de altura.

(IPCS/OMS, 2009).

                 

NOCIVO