TRILANO LN

HERBICIDA

Herbicida sistémico post-emergente selectivo para el control de plantas leñosas así como malezas anuales y perennes.

terre
agro sustentable



HERBICIDA

TRILANO LN

Su mecanismo de acción es hormonal, provocando un desbalance en la división celular y el crecimiento. Su sintomatología es el enrollamiento de las hojas apicales y clorosis masiva en la maleza.

Modo de aplicación:
Se aplica diluido en agua limpia. Se recomienda hacer un análisis de dureza de agua, para asegurarse que no será retenido por los carbonatos. Llenar el tanque con la mitad de agua necesaria, luego el producto y luego completar el agua que se calculó en la calibración de la máquina según la superficie a cubrir. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales. El llenado deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Técnica de aplicación:
Con equipos terrestres, usando boquillas de abanico plano y en especial antideriva, calibrar la máquina con una presión 20/50lb y un gasto de agua entre 50-400 L logrando una homogeneidad de gotas medias a finas, y en aplicaciones aéreas calibrar para utilizar entre 20-50 L de agua / ha.

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	% en peso	Contenido / vol
TRICLOPIR BUTOXIETIL ESTER	61,7 %	667 g/L
EQUIVALENTE TRICLOPIR	44,4 %	480 g/L

TRILANO LN es un herbicida sistémico post-emergente selectivo para el control de plantas leñosas así como malezas anuales y perennes.

USOS RECOMENDADOS

Cultivo o sitio de aplicación	Maleza		Dosis	Observaciones
	Nombre Común	Nombre Científico		
Arroz (Oryza sativa L)	Chirca	Eupatorium buniifolium	1,0 a 1,25 L/ha	Aplicación en post-emergencia temprana. Aplíquese cuando el cultivo de arroz se encuentre entre 3 y 4 hojas (15 días después de la emergencia) y la maleza entre 2 y 4 hojas.
	Chirca blanca	Baccharis spicata		
Campo natural	Espinillo	Acacia caven	1,0 a 2,0 Lt/100 Lt	Control basal en gasoil de leñosas y semileñosas. Aplicar a la base del tronco hasta 0,4 a 1,0 metro de altura.
	Eucaliptos	Eucaliptus spp.	1,5 a 2,0 Lt/100 Lt *	Tocones en gasoil: Leñosas y semileñosas. Aplicar en la superficie del corte, en la corteza subyacente y raíces expuestas enseguida de la tala.
	Zarzamora	Rubus fructicosus	0,5 a 0,75 Lt/100 Lt	Pulverizar el tallo hasta 30 - 40 cm de altura.

* Consulte con su técnico de confianza

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES.

Compatibilidad y fitotoxicidad: TRILANO LN es física y químicamente compatible con la mayoría de agroquímicos, a excepción de los que tienen reacción fuertemente alcalina. Es compatible con 2,4-D, Glifosato, Propanil. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realice una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempo de espera: Para arroz 45 días. Para pastoreo evitar áreas tratadas por al menos un período de 60 días post-aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

Clasificación Toxicológica: CLASE II (dos) - MODERADAMENTE PELIGROSO (IPCS/OMS, 2009).

www.terre.com.uy | +598 94 907 698